



Рак лёгкого лидирует в структуре смертности населения от злокачественных опухолей

КУРЕНИЕ ТАБАКА — ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ РАКА ЛЁГКОГО

Прохождение флюорографии не реже одного раза в 2 года позволяет обнаружить рак лёгкого на ранних стадиях и не допустить развития осложнений, связанных с запущенными формами опухолевого процесса

**Ранняя диагностика –
залог своевременного
начала и эффективности
лечения**



Рак лёгкого у мужчин занимает первое место среди других злокачественных новообразований, и они болеют чаще, чем женщины



Среди курящих
мужчин,
пожизненный риск
развития рака
лёгкого составляет
17,2 %, среди
курящих женщин —
11,6 %

Для некурящих мужчин пожизненный
риск развития рака лёгкого составляет
1,3 %, среди некурящих женщин **1,4 %**



**Риск смерти от рака
лёгкого на 30% выше у
женщин, живущих с
курящими мужчинами**

Курение сигар или трубки в два раза
повышает риск развития рака лёгкого



Риск развития рака лёгкого у курящего человека зависит от:

- числа ежедневно потребляемых сигарет
- продолжительности самого акта курения
- стажа курильщика и типа сигарет



Ранние симптомы рака лёгкого:

- сухой, надсадный кашель, одышка, хрипы в лёгких
- боли в грудной клетке, усиливающиеся при глубоком вдохе
- слабость, утомляемость, похудание
- снижение трудоспособности
- увеличение лимфоузлов



Профилактика рака лёгкого:

- отказ от курения, в том числе и «пассивного»
- применение средств индивидуальной защиты (маски, респираторы) при работе с вредными материалами
- лечение и контроль хронических заболеваний дыхательных путей



Актуальные исследования
показывают, что **в 10% случаев**
злокачественные опухоли
наследуются от близких
родственников

Если кто-то из Вашей семьи болел или
болен онкологическим заболеванием,
рекомендуется записаться на приём к
онкологу и пройти обследование как
можно раньше





Поделись информацией
с друзьями и близкими

