

Птичий грипп, инфекционное заболевание, поражающее не только животных. Контакт с инфицированными птицами способен привести к заражению людей. Чаще регистрируется заражение от кур, индюков, уток, диких птиц (прежде всего чаек)

Высокий риск инфицирования у людей:

- находящихся непосредственно вблизи больной птицы, контактирующих с ней или с инфицированными ею поверхностями, кормом, водой
- вдыхающих зараженный воздух
- разделывающих тушки больных животных.

Инкубационный период составляет 1–3 дня


Симптомы:

- резкая общая слабость, недомогание
- повышение температуры тела в первые часы до 38°C и выше, озноб
- боль в мышцах, суставах

Необходимо срочное обращение к врачу

Птичий грипп

инфекционное заболевание, поражающее не только животных. Контакт с инфицированными птицами способен привести к заражению людей. Чаще регистрируется заражение от кур, индюков, уток, диких птиц (прежде всего чаек)



ВЫСОКИЙ РИСК ИНФИЦИРОВАНИЯ У ЛЮДЕЙ:

- находящихся непосредственно вблизи больной птицы, контактирующих с ней или с инфицированными ею поверхностями, кормом, водой
- вдыхающих зараженный воздух
- разделывающих тушки больных ЖИВОТНЫХ



ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД СОСТАВЛЯЕТ 1–3 ДНЯ СИМПТОМЫ:

- резкая общая слабость, недомогание
- повышение температуры тела в первые часы до 38°C и выше, озноб
- боль в мышцах, суставах

**Необходимо срочное
обращение к врачу**





Массовая гибель диких птиц (прежде всего чайек) в местах скопления людей (парки, места купания, зеленые зоны и др.) представляет реальную угрозу распространения вируса высокопатогенного гриппа



Недопустим контакт с мертвыми птицами, сбор их перьев, использование мертвых тушек для скармливания домашним животным


Вирусы гриппа птиц длительное время сохраняются в воде (более 100 суток) при определенных условиях



КАРАНТИН - ПРОФИЛАКТИКА ПТИЧЬЕГО ГРИППА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КАРАНТИННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- вывозить и ввозить птицу и яйца из птицефабрик
- выгуливать домашнюю птицу
- проводить заготовку кормов
- проводить сельхозярмарки

В эпидочаг запрещено заходить
посторонним людям и выезжать оттуда



ПРОФИЛАКТИКА ПТИЧЬЕГО ГРИППА:

- предотвращение контакта с заболевшим человеком;
- соблюдение карантинных мер (нахождение дома, а не на работе, в школе, в командировке);
- прием иммуномодулирующих средств
- в случае заболевания, необходимо прикрывать рот при кашле, применять маску (периодически ее менять), чаще мыть руки





Поделись информацией
с друзьями и близкими

